Exercice 3 :

La roue d'une loterie est divisée en six secteurs de même aire : 1 Rouge (R), 2 jaunes (J) et 3 verts (V).

On fait tourner la roue, et lorsqu'elle s'arrête, un repère fléchée indique l'un des six secteurs de manière équiprobable.

Un joueur perd 2€ si la flèche indique un secteur Vert, gagne 0.50€ si la flèche indique un secteur Jaune et x euros si la flèche indique un secteur Rouge.

On appelle G la variable aléatoire qui donne le gain du joueur.

1.
 - a. Donner sans détailler la loi de probabilité de G en fonction de x .
 - b. Calculer $E(G)$ en fonction de x .
 - c. Comment choisir x pour que le jeu soit équitable ?
2. On donne l'algorithme suivant :

2. On donne l'algorithme suivant :

Algorithme 1 : Roulette

Variable(s) :
Secteur, i sont des nombres entiers
Effectif est une liste de trois nombres

Entrée(s) :
Saisir un nombre entier N

Début
Effectif[1], Effectif[2] et Effectif[3] prennent la valeur 0.

Pour i allant de 1 à N **Faire**

Secteur prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6

Si (Secteur == 1) **Alors**

Effectif [1] prend la valeur Effectif[1]+1

Sinon

Si (Secteur == 2 OU Secteur == 3) **Alors**

Effectif [2] prend la valeur Effectif[2]+1

Sinon

Effectif [3] prend la valeur Effectif[3]+1

Fin Si

Fin Si

Fin Pour

Afficher « Vous avez obtenu Effectif[1] fois le secteur Rouge »
Afficher « Vous avez obtenu Effectif[2] fois le secteur Jaune. »
Afficher « Vous avez obtenu Effectif[3] fois le secteur Vert. »

Fin

- a. Que fait cet algorithme par rapport au jeu ? Préciser le rôle de chacune des variables.
- b. Ici on donne $x = 5$. Que doit-on rajouter si l'on veut que l'algorithme renvoie aussi le gain **moyen** d'un joueur par partie ?
- c. On saisit $N = 10\,000$. Donner une estimation du gain moyen que l'on s'attend à voir afficher.