

☞ Baccalauréat Centres étrangers Terminale ES 11 juin 2018 ☞

EXERCICE 1

4 POINTS

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses ou l'absence de réponse à une question ne rapportent ni n'enlèvent de point.

Pour répondre, vous recopiez sur votre copie le numéro de la question et indiquez la seule réponse choisie.

- Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = e^{-3x} + e^2$.
 - $f'(x) = -e^{-3x} + 2e$
 - $f'(x) = -3e^{-3x} + e^2$
 - $f'(x) = -3e^{-3x}$
 - $f'(x) = e^{-3x}$
- D'après une étude, le nombre d'objets connectés à Internet à travers le monde est passé de 4 milliards en 2010 à 15 milliards en 2017. L'arrondi au dixième du taux d'évolution annuel moyen est de :
 - 10,5 %
 - 68,8 %
 - 39,3 %
 - 20,8 %
- Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 13$ et d'écart-type $\sigma = 2,4$. L'arrondi au centième de $P(X \geq 12,5)$ est :
 - 0,58
 - 0,42
 - 0,54
 - 0,63
- Soit Y une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[14; 16]$. $P(X \leq 15,5)$ est égal à :
 - 0,97
 - 0,75
 - 0,5
 - $\frac{1}{4}$

EXERCICE 2

5 POINTS

Des algues prolifèrent dans un étang. Pour s'en débarrasser, le propriétaire installe un système de filtration.

En journée, la masse d'algues augmente de 2 %, puis à la nuit tombée, le propriétaire actionne pendant une heure le système de filtration qui retire 100 kg d'algues. On admet que les algues ne prolifèrent pas la nuit.

Le propriétaire estime que la masse d'algues dans l'étang au matin de l'installation du système de filtration est de 2 000 kg.

On modélise par a_n la masse d'algues dans l'étang, exprimée en kg, après utilisation du système de filtration pendant n jours; ainsi, $a_0 = 2000$. On admet que cette modélisation demeure valable tant que a_n reste positif.

- Vérifier par le calcul que la masse a_2 d'algues après deux jours de fonctionnement du système de filtration est de 1 878,8 kg.

2. On affirme que pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = 1,02a_n - 100$.
- Justifier à l'aide de l'énoncé la relation précédente.
 - On considère la suite (b_n) définie pour tout nombre entier naturel n par :

$$b_n = a_n - 5000.$$

Démontrer que la suite (b_n) est géométrique. Préciser son premier terme b_0 et sa raison.

- En déduire pour tout entier naturel n , une expression de b_n en fonction de n , puis montrer que $a_n = 5000 - 3000 \times 1,02^n$.
 - En déterminant la limite de la suite (a_n) , justifier que les algues finissent par disparaître.
3. a. Recopier et compléter l'algorithme suivant afin qu'il détermine le nombre de jours nécessaire à la disparition des algues.

$N \leftarrow 0$
$A \leftarrow 2000$
Tant que ...
$A \leftarrow \dots$
$N \leftarrow N + 1$
Fin Tant que
Afficher ...

- Quel est le résultat renvoyé par l'algorithme?
4. a. Résoudre par le calcul l'inéquation $5000 - 3000 \times 1,02^n \leq 0$.
- Quel résultat précédemment obtenu retrouve-t-on?

EXERCICE 2

5 POINTS

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Une société d'autoroute étudie l'évolution de l'état de ses automates de péage en l'absence de maintenance.


Un automate peut se trouver dans l'un des états suivants :

- fonctionnel (F) ;
- en sursis (S) s'il fonctionne encore, mais montre des signes de faiblesse ;
- défaillant (D) s'il ne fonctionne plus.

La société a observé que d'un jour sur l'autre :

- concernant les automates fonctionnels, 90 % le restent et 10 % deviennent en sursis ;
- concernant les automates en sursis, 80 % le restent et 20 % deviennent défaillants.

- a. Reproduire et compléter le graphe probabiliste ci-après qui représente les évolutions possibles de l'état d'un automate.



- Interpréter le nombre 1 qui apparaît sur ce graphe. (

- Voici la matrice de transition $M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ associée à ce graphe en prenant les

sommets dans l'ordre F, S, D.

Préciser la signification du coefficient 0,2 dans cette matrice.

2. À compter d'une certaine date, la société relève chaque jour à midi l'état de ses automates. On note ainsi pour tout entier naturel n :

- f_n la probabilité qu'un automate soit fonctionnelle n -ième jour ;
- s_n la probabilité qu'un automate soit en sursis le n -ième jour ;
- d_n la probabilité qu'un automate soit défaillant le n -ième jour.

On note alors $P_n = (f_n \quad s_n \quad d_n)$ la matrice ligne de l'état probabiliste le n -ième jour.

Enfin, la société observe qu'au début de l'expérience tous ses automates sont fonctionnels : on a donc $P_0 = (1 \quad 0 \quad 0)$.

- a. Calculer P_1 .
 - b. Montrer que, le 3^e jour, l'état probabiliste est $(0,729 \quad 0,217 \quad 0,054)$.
 - c. Vérifier que ce graphe possède un unique état stable $P = (0 \quad 0 \quad 1)$.
Quelle est la signification de ce résultat pour la situation étudiée?
3. a. Justifier que pour tout entier naturel n , $s_{n+1} = 0,1f_n + 0,8s_n$.
- b. On vérifierait de même que pour tout entier naturel n ,

$$d_{n+1} = 0,2s_n + d_n \quad \text{et} \quad f_{n+1} = 0,9f_n.$$

Compléter l'algorithme ci-dessous de sorte qu'il affiche le nombre de jours au bout duquel 30 % des automates ne fonctionnent plus.

```

D ← 0
S ← ...
F ← 1
N ← 0
Tant que ...
    D ← 0,2 × S + D
    S ← 0,1 × F + 0,8 × S
    F ← 0,9 × F
    N ← ...
Fin Tant que
Afficher ...

```

- c. Au bout de combien de jours la proportion d'automates défaillants devient-elle supérieure à 30 %?
- d. Dans le codage de la boucle « Tant que », l'ordre d'affectation des variables D , S et F est-il important? Justifier.

EXERCICE 3

5 POINTS

Une entreprise dispose d'un stock de guirlandes électriques. On sait que 40 % des guirlandes proviennent d'un fournisseur A et le reste d'un fournisseur B.

Un quart des guirlandes provenant du fournisseur A et un tiers des guirlandes provenant du fournisseur B peuvent être utilisées uniquement en intérieur pour des raisons de sécurité. Les autres guirlandes peuvent être utilisées aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

1. On choisit au hasard une guirlande dans le stock.
 - On note A l'évènement « la guirlande provient du fournisseur A » et B l'évènement « la guirlande provient du fournisseur B ».
 - On note I l'évènement « la guirlande peut être utilisée uniquement en intérieur ».
 - a. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

- b. Montrer que la probabilité $P(I)$ de l'évènement I est 0,3.
- c. On choisit une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le responsable de l'entreprise estime qu'il y a autant de chance qu'elle provienne du fournisseur A que du fournisseur B.
Le responsable a-t-il raison? Justifier.
2. Une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur est vendue 5 € et une guirlande pouvant être utilisée uniquement en intérieur est vendue 3 €. Calculer le prix moyen d'une guirlande prélevée au hasard dans le stock.
3. Lors d'un contrôle qualité, on prélève au hasard 50 guirlandes dans le stock. Le stock est suffisamment grand pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise. On admet que la proportion de guirlandes défectueuses est égale à 0,02. Calculer la probabilité qu'au moins une guirlande soit défectueuse. Arrondir le résultat à 10^{-3} .
4. L'entreprise souhaite connaître l'opinion de ses clients quant à la qualité de ses guirlandes électriques. Pour cela elle souhaite obtenir, à partir d'un échantillon aléatoire, une estimation de la proportion de clients satisfaits au niveau de confiance de 95 % à l'aide d'un intervalle de confiance d'amplitude inférieure ou égale à 8 %.
Combien l'entreprise doit-elle interroger de clients au minimum?


EXERCICE 4**6 POINTS**

On considère la fonction dérivable f définie sur $I = [0 ; 20]$ par :

$$f(x) = 1000(x+5)e^{-0,2x}.$$

Partie A - Étude graphique

On a représenté sur le graphique ci-dessous, la courbe représentative de la fonction f .
Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.



1. Résoudre graphiquement et de façon approchée l'équation $f(x) = 3000$.

2. Donner graphiquement une valeur approchée de l'intégrale de f entre 2 et 8 à une unité d'aire près. Justifier la démarche.

Partie B - Étude théorique

1. On note f' la dérivée de la fonction f sur $[0; 20]$.
Démontrer que pour tout x de $[0; 20]$, $f'(x) = -200xe^{-0,2x}$.
2. En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau des variations sur l'intervalle $[0; 20]$.
Si nécessaire, arrondir à l'unité les valeurs présentes dans le tableau.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = 3000$ admet une unique solution α sur $[0; 20]$, puis donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près à l'aide de la calculatrice.
4. On admet que la fonction F définie sur l'intervalle $[0; 20]$ par l'expression $F(x) = -5000(x + 10)e^{-0,2x}$ est une primitive de la fonction f sur $[0; 20]$.
Calculer $\int_2^8 f(x) dx$. On donnera la valeur exacte, puis la valeur arrondie à l'unité.

Partie C - Application économique

La fonction de demande d'un produit est modélisée sur l'intervalle $[0; 20]$ par la fonction f étudiée dans les parties A et B.

Le nombre $f(x)$ représente la quantité d'objets demandés lorsque le prix unitaire est égal à x euros.

Utiliser les résultats de la partie B afin de répondre aux questions suivantes :

1. En-dessous de quel prix unitaire, arrondi au centime, la demande est-elle supérieure à 3 000 objets?
2. Déterminer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[2; 8]$. Interpréter ce résultat.