

1) RAPPELS

\emptyset est appelé événement impossible : $p(\emptyset) = 0$

Ω est appelé événement certain : $p(\Omega) = 1$

Dans le cas d'une loi équiprobable (la probabilité des événements élémentaires est la même), la probabilité d'un événement A est :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas total}}$$

L'événement contraire de A noté \bar{A} est constitué des événements de Ω n'appartenant pas à A

On a : $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$

Soient A et B deux événements de Ω

On note $A \cap B$ l'événement A et B composé des événements élémentaires de A et de B

c'est à dire lorsque A et B sont réalisés simultanément.

On note $A \cup B$ l'événement A ou bien B constitué des événements élémentaires de A ou bien de B .

On a alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Deux événements A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent être réalisés simultanément.

On a donc $p(A \cap B) = 0$

2) PROBABILITE CONDITIONNELLE

Soit A un événement de l'univers Ω muni de la loi P tel que $P(A) \neq 0$.

On définit sur Ω une nouvelle loi de probabilité notée P_A en posant pour tout événement B

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

P_A est appelée probabilité conditionnelle sachant que A est réalisé. On note encore

$$P_A(B) = P(B|A), \text{ probabilité de } B \text{ sachant } A.$$

Remarque

Comme $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$, on a aussi $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

La réalisation de $A \cap B$ s'obtient en réalisant A , puis B sachant que A est réalisé.

3) PROBABILITE TOTALE


On considère des évènements A_1, A_2, \dots, A_n formant une partition de l'univers Ω (leur réunion donne Ω et ils sont deux à deux disjoints et non vide).

Alors pour tout évènement B ,

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B),$$

avec pour tout i pris entre 1 et n , $P(A_i \cap B) = P(A_i) \times P_{A_i}(B)$.

on donc $p(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$



Rédaction type :

D'après la **formule des probabilités totales** :

$$\begin{aligned} p(B) &= p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) \\ &= p(A) \times p_A(B) + p(\bar{A}) \times p_{\bar{A}}(B) \end{aligned}$$

4) EVENEMENTS INDEPENDANTS

On dit que deux évènements A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Cela revient à dire que si $P(A) \neq 0$, $P_A(B) = P(B)$.

(il est naturel de dire que A et B sont indépendants si la probabilité de B est la même que la probabilité de B sachant A)

5) LOI BINOMIALE

Soit n un entier naturel non nul et p un réel tel que $0 < p < 1$

Si on effectue n épreuves successives, indépendantes et identiques avec 2 issues possibles : succès avec une probabilité p et échec avec une probabilité $1-p$

alors c' est un schéma de Bernoulli

si X est la variable aléatoire égale au nombre de succès au cours des n épreuves

X suit une loi binomiale de paramètres n et p

Soit n et k deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n$, on appelle **coefficient binomial** et on note $\binom{n}{k}$ ou bien C_n^k le nombre de chemins de l'arbre pondéré correspondant à k succès dans un schéma de Bernoulli de n épreuves répétées
c'est à dire le nombre de chemins correspondant à une liste de k succès parmi n épreuves répétées.

Pour tout entier k tout entier n tels que $0 \leq k \leq n$, si on a $p(S) = p$ et $P(\bar{S}) = 1 - p$, la probabilité d'obtenir k succès parmi n est :

$$p(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

Si X suit une loi binomiale de paramètres n et p alors $E(X) = np$

6) VARIABLES ALÉATOIRES

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X associée à chaque valeur a_i prise par X la probabilité de l'événement $(X = a_i)$.

On présente une loi de probabilité sous la forme d'un tableau.

x	x_1	x_2	...	x_n
$p(X = x)$	p_1	p_2	...	p_n

Soit X une variable aléatoire qui prend les valeurs a_i avec les probabilités $p_i = p(X = a_i)$.

On appelle **espérance mathématique** de X le nombre :

$$E(X) = a_1 \times p_1 + a_2 \times p_2 + \dots + a_n \times p_n$$