TS PROBABILITE feuille 136a

Les trois parties A, B et C peuvent être traitées de façon indépendante

## Partie A

Le chikungunya est une maladie virale transmise d'un être humain à l'autre par les piqures de moustiques femelles infectées.

Un test a été mis au point pour le dépistage de ce virus. Le laboratoire fabriquant ce test fournit les caractéristiques suivantes :

- la probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 0.98;
- la probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 0,01.


On procède à un test de dépistage systématique dans une population « cible ». Un individu est choisi au hasard dans cette population. On appelle :

- M l'évènement : « L'individu choisi est atteint du chikungunya »
- T l'évènement : « Le test de l'individu choisi est positif »

On notera  $\overline{M}$  (respectivement  $\overline{T}$ ) l'évènement contraire de l'évènement M (respectivement T).

On note p ( $0 \le p \le 1$ ) la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la population cible.

a. Recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous.



- **b.** Exprimer  $P(M \cap T)$ ,  $P(\overline{M} \cap T)$  puis P(T) en fonction de p.
- 2. a. Démontrer que la probabilité de M sachant T est donnée par la fonction f définie sur [0; 1] par :

$$f(p) = \frac{98p}{97p+1}.$$

- **b.** Étudier les variations de la fonction f.
- On considère que le test est fiable lorsque la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte du chikungunya est supérieure à 0,95.

En utilisant les résultats de la question 2, à partir de quelle proportion p de malades dans la population le test est-il fiable?

TS PROBABILITE feuille 136b

## Partie B

En juillet 2014, l'institut de veille sanitaire d'une île, en s'appuyant sur les données remontées par les médecins, publie que 15% de la population est atteinte par le virus.

Comme certaines personnes ne consultent pas forcément leur médecin, on pense que la proportion est en réalité plus importante.

Pour s'en assurer, on se propose d'étudier un échantillon de 1 000 personnes choisies au hasard dans cette île. La population est suffisamment importante pour considérer qu'un tel échantillon résulte de tirages avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 1 000 personnes choisies au hasard, fait correspondre le nombre de personnes atteintes par le virus et par F la variable aléatoire donnant la fréquence associée.

- a. Sous l'hypothèse p = 0, 15, déterminer la loi de X.
  - b. Dans un échantillon de 1 000 personnes choisies au hasard dans l'île, on dénombre 197 personnes atteintes par le virus.

Quelle conclusion peut-on tirer de cette observation à propos du chiffre de 15 % publié par l'institut de veille sanitaire?

Justifier. (On pourra s'aider du calcul d'un intervalle de fluctuation au seuil de 95 %.)

On considère désormais que la valeur de p est inconnue.

En utilisant l'échantillon de la question **1.b.**, proposer un intervalle de confiance de la valeur de *p*, au niveau de confiance de 95 %.

## Partie C

Le temps d'incubation, exprimé en heures, du virus peut être modélisé par une variable aléatoire T suivant une loi normale d'écart type  $\sigma = 10$ .

On souhaite déterminer sa moyenne  $\mu$ .

La représentation graphique de la fonction densité de probabilité de *T* est donnée en annexe.

- a. Conjecturer, à l'aide du graphique, une valeur approchée de μ.
  - b. On donne p(T < 110) = 0,18. Hachurer sur le graphique un domaine dont l'aire correspond à la probabilité donnée.
- 2. On note T' la variable aléatoire égale à  $\frac{T-\mu}{10}$ .
  - a. Quelle loi la variable aléatoire T' suit-elle?
  - b. Déterminer une valeur approchée à l'unité près de la moyenne μ de la variable aléatoire T et vérifier la conjecture de la question 1.